

License Holder/ Détenteur de la licence
Mucos Pharma GmbH & Co. KG, Miraustraße 17 - 13509 Berlin, Germany
Imported in Canada by/ Importé au Canada par
Mucos Canada, Richmond Hill, ON L4S 0J7
gardenoflifecanada.com • wobenzym.ca

Recommended Dose: Adults: Take 2 tablets 2 times daily at least 45 minutes before meals with cold water or as recommended by a healthcare practitioner. Do not crush or chew. Consult a healthcare practitioner for prolonged use (beyond 1 year).

Dosage recommandé : Adultes : Prendre 2 comprimés, 2 fois par jour au moins 45 minutes avant les repas avec de l'eau froide ou tel que recommandé par un professionnel de la santé. Ne pas écraser ou mâcher. Consultez un professionnel de la santé pour un usage prolongé (au-delà d'un an).

Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in a cool, dry place. Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.

Gardez hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact. Il est possible que le contenu ne puisse pas remplir le paquet afin de tenir compte de l'espace requis pour l'étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.

NPN 80041539

Wobenzym[®]
plus

A factor in ankle joint injury recuperation.
Relieves pain associated with osteoarthritis
of the knee and hip.

Aide à récupérer d'une blessure
à la cheville. Soulage la douleur
associée à l'arthrose du genou
et de la hanche.



480 enteric-coated tablets
480 comprimés à
enrobage entérique



201910-480CN
WOBPL-480
V3



Medicinal Ingredients (per tablet)
Ingrédients médicinaux (par comprimé)

Bromelain (from pineapple (<i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i>) stem)	135 mg (675 FIP/ 5 062 500 FCC PU)
Bromélaïne (de tige d'ananas (<i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i>))	

Trypsin (from porcine (<i>Sus scrofa</i>) or bovine (<i>Bos taurus</i>) pancreas)	72 mg (2160 FIP/ 172 800 USP trypsin units/
Trypsine (de pancréas porcin (<i>Sus scrofa</i>) ou bovin (<i>Bos taurus</i>))	unités de trypsine de la USP)

Rutoside trihydrate (from <i>Styphnolobium</i> <i>japonicum</i> flower bud)	150 mg
Trihydrate de rutoside (de bourgeons de <i>Styphnolobium japonicum</i>)	

Non-medicinal ingredients: Cellulose, dibasic calcium phosphate dihydrate, hypromellose, ethylcellulose, sodium alginate, medium chain triglycerides, oleic acid, stearic acid, magnesium stearate, silica.

Ingrédients non médicinaux : Cellulose, phosphate de calcium dibasique dihydraté, hypromellose, éthylcellulose, alginate de sodium, triglycérides de chaîne moyenne, acide oléique, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice.

Risk Information: Do not use if you are pregnant, breastfeeding or are sensitive to pork protein. Consult a healthcare practitioner prior to use if you have gastrointestinal lesion, bleeding disorders, are taking anticoagulant, anti-inflammatory or antibiotic medications, or are having surgery. Stop use if allergy, nausea, vomiting or diarrhoea occurs.

Mention des risques : Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, vous allaitez ou vous êtes allergique aux protéines porcines. Consultez un professionnel de la santé avant l'usage si vous souffrez de lésions gastrointestinales, de problèmes de coagulation, si vous prenez des médicaments anticoagulants, anti-inflammatoires ou antibiotiques, ou si vous êtes sur le point de subir une chirurgie. Cesser l'utilisation en cas d'allergie, de nausée, de vomissement ou de diarrhée.