

Douglas Laboratories Canada • Richmond Hill, ON L4C 0L8 • www.douglaslabs.ca

Suggested Usage: Adults: Take 1 or 2 tablets daily with food or as directed by your healthcare practitioner. Use the smallest effective dose which controls symptoms. Consult your healthcare practitioner for use beyond 4 weeks./ **Usage Suggéré :** Adultes : Prendre 1 ou 2 comprimés par jour avec de la nourriture ou selon l'avis de votre professionnel de la santé. Utiliser la dose minimale efficace pour contrôler les symptômes. Consultez votre professionnel de la santé pour un usage qui dépasse quatre semaines.

U
1053902222
00

Risk Information: Do not use if you are sensitive to pancreatic enzymes or pork proteins. Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant, breastfeeding, taking blood thinners, anti-inflammatories, or antibiotics, are following a low protein diet, have diabetes, a gastrointestinal ulcer, pancreatitis, pancreatic exocrine insufficiency, cystic fibrosis, or are having surgery. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Hypersensitivity, nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain and heartburn have been known to occur, in which case discontinue use. Do not use if seal is broken or missing. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children./ **Mention des risques :** Ne pas utiliser si vous êtes sensible aux enzymes pancréatiques ou aux protéines de porc. Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des anticoagulants, des anti-inflammatoires ou des antibiotiques, si vous suivez un régime faible en protéines, si vous souffrez de diabète, d'ulcères gastrentestinaux, de pancréatite, d'insuffisance pancréatique exocrine ou de fibrose kystique, ou si vous devez subir une chirurgie. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. Une hypersensibilité, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et des brûlures d'estomac peuvent se manifester. Si tel est le cas, cesser l'utilisation. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder hors de la portée des enfants.

Ultrazyme®

Digestive enzymes / Enzymes digestives

NPN 80074567



60 Tablets
Comprimés

Each Tablet Contains/ Chaque Comprimé Contient:

Pancreatic enzymes/ Enzymes pancréatiques (from pancreas of/ de pancréas de <i>Sus scrofa</i>)	62.5 mg
Yielding/ Rendement:	
Lipase	1000 USP
Amylase	12 500 USP
Protease/ Protéase	12 500 USP
Stem bromelain/ Bromélaïne de tige (from/ d' <i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i>)	88.25 mcg (1 500 000 FCC PU)
Ox Bile/ Bile de bœuf (<i>Bos taurus</i>)	50 mg
Cellulase (from/ de <i>Trichoderma reesei</i>)	3 mg (45 FCC CU)
L-Lysine (l-lysine monohydrochloride/ monochlorhydrate de l-lysine)	40 mg
Pepsin/ Pepsine (from stomach of/ d'estomac de <i>Sus scrofa</i>)	33 mg (330 000 FCC PU)

Non-medicinal ingredients: Dicalcium phosphate dihydrate, cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, magnesium stearate, silica, tablet coating (hypromellose, glycerin). **Ingrédients non-médicinaux :** Phosphate de dicalcium dihydraté, cellulose, croscarmellose de sodium, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice, enrobage du comprimé (hypromellose, glycerine).

7022-60HYC • V2