

Store sealed in a cool dry area. Use only if safety seal is intact. *Conserver le produit scellé dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.*

Recommended Use: Helps to support digestion.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule with each meal 3 times a day, or as directed by a healthcare professional. Consult a healthcare practitioner for prolonged use.

Usage recommandé : Favorise la digestion.

Dose recommandée : Adultes : Prendre une capsule avec chaque repas 3 fois par jour, ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé. Pour toute utilisation prolongée, consultez un professionnel de la santé.



Betaine HCl Pepsin

NPN 80060441
Hypoallergenic / Hypoallergénique
250 VEGETABLE CAPSULES
250 CAPSULES VÉGÉTALES

Medicinal Ingredients (per capsule): Betaine hydrochloride 520 mg, Pepsin (Sus scrofa - stomach) 21 mg / 210,000 FCC PU.
Non-Medicinal Ingredients: Hypo-allergenic plant cellulose, Ascorbyl palmitate, Hydroxypropyl methylcellulose, Purified water.
Ingrédients médicinaux (par capsule): Chlorhydrate de bétaine 520mg, pepsine (Sus scrofa - estomac) 21 mg / 210 000 pepsin de FCC.
Ingrédients non médicinaux: Cellulose de plante hypoallergénique, palmitate d'ascorbyle, hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée.

Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, if you have peptic ulcer or excess stomach acid, if you have gastrointestinal lesions/ulcers, if you have high cholesterol, if you are having surgery, or if you are taking anticoagulant or anti-inflammatory agents.

Known Adverse Reactions: Hypersensitivity/allergy has been known to occur, in which case, discontinue use.

Avertissement : Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous souffrez d'ulcères gastroduodénaux, si vous avez un excès d'acide gastrique, si vous avez des lésions gastrointestinales ou des ulcères, si vous avez d'un haut taux de cholestérol, si vous prenez des anticoagulants, des anti-inflammatoires ou avant de subir une chirurgie.

Réactions indésirables connues : Une hypersensibilité/allergie peut se manifester; si tel est le cas, cesser l'utilisation.

Keep out of the reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.