

Store sealed in a cool dry area. Use only if safety seal is intact. *Conserver le produit scellé dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.*

code: CL16C

Recommended Use: May help to support a modest reduction in fat mass when used with a program of reduced intake of dietary calories and increased physical activity.

Recommended Dose: Adults: Take 4–5 softgels daily, in divided doses, with meals.

Duration of Use: Consult a healthcare practitioner for use beyond 6 months.

Usage recommandé : *Pourrait aider à contribuer à une légère diminution de la masse adipeuse dans le cadre d'un programme qui recommande une réduction de l'apport calorique et une augmentation de l'activité physique.*

Dose recommandée : *Adultes : Prendre de 4 à 5 gélules par jour, en doses divisées, avec les repas.*

Durée d'utilisation : *Consulter un professionnel de la santé pour toute utilisation au-delà de 6 mois.*



pure
encapsulations®

CLA

(conjugated linoleic acid)
(acide linoléique conjugué)

**1000 mg complex
complexe de 1000 mg**

NPN: 80017119

Hypo-allergenic / Hypoallergénique

60 SOFTGELS
GÉLULES

Medicinal ingredients (per softgel capsule): Conjugated linoleic acid complex 1000 mg (providing 770 mg conjugated linoleic acid) (derived from processed safflower oil).

Non-medicinal ingredients: Gelatin, glycerin, purified water, carob extract, vitamin E, caramel.

Ingrédients médicinaux (par gélule) : complexe d'acide linoléique conjugué 1 000 mg (fournissant 770 mg d'acide linoléique conjugué) (provenant d'huile de carthame transformée).

Ingrédients non médicinaux : gélatine, glycérine, eau purifiée, extrait de caroube, vitamine E, caramel.

Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if your goal is to achieve weight loss, if you are pregnant or breastfeeding or if you are obese or have cardiovascular disease (CVD) risk factors (e.g. high blood pressure, high cholesterol and/or triglycerides).

Contraindications: Do not use if you have CVD, diabetes, metabolic syndrome or insulin resistance.

Known Adverse Reactions: Some people may experience gastrointestinal upset.

Avertissement : Consulter un professionnel de la santé avant toute utilisation si vous vous êtes fixé comme objectif de perdre du poids, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous souffrez d'obésité ou si vous avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV) (par ex. si vous souffrez d'hypertension artérielle, d'un haut taux de cholestérol et/ou de triglycérides).

Contre-indications : Ne pas utiliser si vous souffrez d'une MCV, de diabète, du syndrome métabolique ou si vous avez une résistance à l'insuline.

Réactions indésirables connues : Certaines personnes pourraient souffrir de troubles gastrointestinaux.

Keep out of the reach of children.
Garder hors de la portée des enfants.

Manufactured in Canada. / Fabriqué au Canada.

Licence holder / Titulaire de la licence:

pure encapsulations, inc.

Richmond Hill, ON L4C 0L8



v4