

Store sealed in a cool dry area. Use only if safety seal is intact. *Conserver le produit scellé dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.*

**Recommended Use:** Aids in the management of polycystic ovarian syndrome (PCOS) by helping to restore normal ovarian function. Aids in the management of PCOS by reducing oxidative stresses. Helps to restore ovulation and oocyte quality and to normalize menstrual cycle irregularities. Helps to reduce serum testosterone in women with PCOS. Aids in the management of PCOS's hormonal and metabolic conditions by promoting healthy glucose metabolism.

**Recommended Dose:** Adults: Take 1 scoop 1 – 2 times daily, or as directed by a healthcare professional. Use for a minimum of 12 weeks to see beneficial effects.

**Warning:** Consult a healthcare practitioner before taking this product if you are pregnant or breastfeeding. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen.



7

66298 01672

6



# Inositol

NPN 80062356  
Hypoallergenic / Hypoallergénique  
250 GRAMS POWDER  
250 GRAMMES POUDRE

**Medicinal Ingredients (per scoop): Inositol (Myo-inositol) 2.05 g.**

**Ingrédients médicinaux (par cuillérée) : Inositol (Myo-inositol) 2.05 g.**

**Usage recommandé :** Aide à contrôler le syndrome des ovaires polykystiques en rétablissant la fonction ovarienne normale. Favorise le contrôle du syndrome des ovaires polykystiques en réduisant le stress oxydatif. Aide à rétablir l'ovulation et la qualité des ovocytes et à normaliser les irrégularités du cycle menstruel. Aide à réduire le niveau de testostérone sérique chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques. Aide à contrôler les niveaux hormonaux et métaboliques chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques en soutenant un sain métabolisme du glucose.

**Dose recommandée :** Adultes : Prendre une cuillérée une à deux fois par jour ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé. Utiliser au moins pendant douze semaines afin de constater des effets bénéfiques.

**Avertissement :** Consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous êtes enceinte ou allaitante. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consulter un professionnel de la santé.

**Keep out of the reach of children./ Garder hors de la portée des enfants.**

