

Store sealed in a cool dry area. Use only if safety seal is intact.
Conserver le produit scellé dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.

Recommended Use: Factors in the maintenance of good health. Helps to promote healthy mood balance. Helps to reduce the severity and duration of migraine headaches when taken as a prophylactic.

Recommended Dose: Adults: Take 2 capsules one or two times daily, or as directed by a healthcare practitioner. For healthy mood balance and migraine prophylaxis: Take 2 capsules two times daily, or as directed by a healthcare practitioner. Take with food a few hours before or after taking other medications or natural health products. Consult a healthcare practitioner for use beyond 3 months.

Usage recommandé : Contribue au maintien d'une bonne santé. Aide à promouvoir un bon équilibre de l'humeur. Aide à diminuer la gravité et la durée des migraines lorsqu'elle est prise à titre préventif.

Dose recommandée : Adultes : Prendre deux capsules une à deux fois par jour, ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé. Pour un bon équilibre de l'humeur et la prophylaxie de la migraine : Prendre deux capsules deux fois par jour, ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé. Prendre avec de la nourriture quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Consulter un professionnel de la santé pour toute utilisation supérieure à trois mois.

Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany / Metafolin® est une marque de commerce déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

MERIVA® is a trademark of Indena S.p.A.
est une marque de commerce d'Indena S.p.A.

PHYTOSOME® is a trademark of Indena S.p.A.
est une marque de commerce d'Indena S.p.A.



NeuroPure

NPN 80049188

120 VEGETABLE CAPSULES
120 CAPSULES VÉGÉTALES

Medicinal Ingredients (per capsule): L-5-Hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed) 50 mg, Di-Phenylalanine 350 mg, Meriva® Curcuminoids-phosphatidylcholine long-chain/Glycine max seed) 75 mg (standardized to contain 33% curcuminoids), Quercetin 50 mg, Folate (calcium L-5-methyltetrahydrofolate B, Metafolin®) 250 mcg, Zinc (zinc picolinate) 15 mg, Vitamin B6 (pyridoxal 5'-phosphate) 3.4 mg.

Non-Medicinal Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, Purified water.

Contains: Soy

Ingédients médicinaux (par capsule) : L-5-Hydroxytryptophane (provenant de la graine de Griffonia simplicifolia 50 mg, di-Phénylealanine 350 mg, Meriva® complexe de curcuminoïdes-phosphatidylcholine (provenant de la graine de Curcuma longa graine de Glycine max) 75 mg (standardisé pour contenir 33 % de curcuminoïdes), quercétine 50 mg, folate (méthyltétrahydrofolate L-5-de calcium, Metafolin®) 250 mcg, zinc (picolinat de zinc 5 mg, vitamine B6 (pyridoxal 5'-phosphate) 3.4 mg.

Ingédients non médicinaux : Hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée.

Contain: Soja

Warning: Do not use if you are pregnant, breastfeeding, taking Levodopa, a medication used to treat Parkinson's disease, or have scleroderma, phemyxtonuria, or tardive dyskinesia. Consult a healthcare practitioner prior to use if you are taking an triptalelet medication, blood thinners, antidepressants, or drugs/supplements with serotonergic activity. These may include, but are not limited to, L-tryptophan, S-adrenosymine, fluoxetine (SAA), St. John's wort, antidepressants, pain killers, over-the-counter cough and cold medication containing dextromethorphan, anti-nausea medication and anti-migraine medication. Consult a healthcare practitioner prior to use if you are following a low protein diet or have gallstones, a bile duct obstruction, stomach ulcers, or excess stomach acid. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Discontinue use and consult a healthcare practitioner if you experience skin changes or show signs of weakness, oral ulcers, or abdominal pain accompanied by severe muscle pain. Exercise caution if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring mental alertness. Some people may experience drowsiness, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. Folic acid supplementation may mask a B₁₂ deficiency, ask your healthcare practitioner if you are taking sufficient B₁₂.

Avertissement : N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez du Levodopa, un médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, ou si vous souffrez de sclérodermie, de phényxtonuria, ou de dystylie tardive. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous prenez des anti-agrégants plaquettaires, des anticoagulants, des antidépresseurs comme des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou inhibiteurs spécifiques du récepteur de la sérotonine (SRS), d'autres médicaments antipsychotiques, des médicaments à base de carbodopa ou des médicaments ou compléments qui stimulent l'activité sérotoninergique. Ce la peut inclure, sans s'y limiter, le L-Tryptophane, le S-Adenosylmethionine (SAMe), le millepertuis commun, des médicaments en vente libre contre la toux et le rhume contenant du dextrométhorphone, des médicaments contre la nausée et contre la migraine. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous suivez un régime faible en protéines ou si vous avez des calculi biliaires, une obstruction du canal cholodique, des ulcères gastriques, ou un excès d'acide gastrique. Consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. Casser de prendre ce produit et consulter un professionnel de la santé si vous constatez des modifications cutanées ou si vous présentez des signes de faiblesse, des ulcerations buccales, ou des douleurs abdominales accompagnées de douleurs musculaires intenses. Faire preuve de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé, ou si vous devez entreprendre des activités qui requièrent de la vigilance. Certaines personnes peuvent éprouver de la somnolence, de la diarrhée, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. La prise d'un complément d'acide folique peut masquer une carence en vitamine B₁₂, informez-vous auprès de votre professionnel de la santé pour savoir si vous prenez suffisamment de vitamine B₁₂.

Keep out of
the reach of
children.
Garder hors
de la portée
des enfants.

Manufactured by / Fabricqué par :
Pure Encapsulations, Inc.
 Sudbury, MA 01776 USA
Licence holder / Titulaire de la licence :
Pure Encapsulations, Inc.
 Richmond Hill, ON L4C 0L8

code: NOP1C



v3